

IB Übersicht laufender Studien des Brust- und gynäkologischen Zentrums DEG / BZ - GZ

Gültig
ab:03.02.2021
Version:12
Prozess: K/6.21
Intranet: -
Ersteller: Stud.Ass.
Verantwortung: ChA BZ

In der nachstehenden Tabelle wird eine Übersicht der laufenden Mammakarzinom Studien gegeben.

Studien	Studiename	Kurzinformation zur Studie
Prävention:	Keine	Aktuell keine laufenden Studien
Neoadjuvant:	Destiny	In Vorbereitung Früher Brustkrebs mit verbleibenden Resten nach neoadjuvanter Therapie mit einem hohen Risiko dass die Erkrankung wiederauftritt. Hochrisiko ist definiert als nicht operabel, oder aber positive Lymphknoten nach neoadjuvanter Therapie. Her2+ HR + und HR- Frauen und Männer. Studienware ist T-DXd
Postneoadjuvant:	Sascia	Postneoadjuvante Behandlung mit Sacitumab Govitecan (Antikörper bei hohem Rückfallrisiko nach neoadjuvanter Therapie bei Her2 - Patientinnen
Adjuvant:		
Neo-/ adjuvant:	Gepar Douze	Neoadjuvante Therapie mit adjuvanter Fortsetzung von Atezoizumab oder Placebo bei triple neg Patienten
Registerstudien:	Mammakarzinom des Mannes	Eine prospektive Registerstudie der Universitätsfrauenklinik Magdeburg in Zusammenarbeit mit den klinischen Krebsregistern zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinomes des Mannes
	Breastcancer in Pregnancy	Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinomes in der Schwangerschaft und Vergleichskohorte junge Patientinnen (unter40) ohne Schwangerschaft
	BrainMet	Prospektiv und retrospektiv Datenerhebung (Pat nach 2000) zu Erkrankungsverläufen bei Hirnfiliae eines histologisch gesicherten Mammakarzinomes
	Plan B	Langzeitregister für ehemalige Plan B Patientinnen, die 5 Jahre unter endokriner Therapie keinen Relaps hatten.
Nicht interven-tionelle Studien	Eleanor	Neratinib bei Patientinnen mit HER ² -positivem Brustkrebs: eine multizentrische, internationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in Deutschland und Österreich
	Perform	Nicht interventionelle Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von Palbociclib in der Behandlung von Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierten Brustkrebs
Metastasiert:	praegnant	Prospektives Akademisches Translacionales Forschungsnetzwerk zur Optimierung der onkologischen Versorgungsqualität in der adjuvanten und fortgeschrittenen Metastasierung
	Amica	Antihormonelle Erhaltungstherapie nach First-Line-Chemotherapie mit oder ohne DCK/6-Inhibitor Ribociclib bei Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, metastasierten Brustkrebs. Phase II Studie

Inzwischen geschlossene Studien, an denen das Zentrum teilgenommen hat:

ADEBAR, EC-Doc, NNBC3, TEAM, HERA (Uni München), TbP, Gepartrio, Techno, IBIS II, Vinorelbin, Geparquattro, SOFT, TEXT, EXPAND, PELICAN, HEDON, ATHENA, TEACH, EVALUATE TM, Geparquinto, ALTTO, Plan B, PreFace, Madonna, Sentina, Panther, TaBea, SOLE, PrefHer, APHINITY, LUX BREAST-1, SafeHer, Pref Her, Strahlentherapie BB Regensburg: Brachytherapie-Studie; Geparsepto, Avanti, Neoeribulin, Strahlentherapie am Hause. ARO 2010-01, Aro2013-14, Brawo Helena; Olympia; Gepar X; Adapt HR+Her2-, Adapt triple-, Adapt elderly, Adapt triple+, Adapt Her2+HR-,



IB Übersicht laufender Studien des Brust- und gynäkologischen Zentrums DEG / BZ - GZ

Gültig
ab:03.02.2021
Version:12
Prozess: K/6.21
Intranet: -
Ersteller: Stud.Ass.
Verantwortung: ChA BZ

In der nachstehenden Tabelle wird eine Übersicht der laufenden gynäkologischen Studien gegeben.

Studien	Studiename	Kurzinformation zur Studie
Prävention:	Keine	Aktuell keine laufenden Studien
Adjuvant:	OVAR26/Matao	In Bearbeitung: Erhaltungstherapie mit Aromataseinhibitor epitheliales Ovarialcarzinom doppelblinde Placebo kontrollierte Phase III Studie
Registerstudien:	Onkotrakt	Psychoonkologische Studie bei gynäkologischen Tumoren
	Regsa	Gynäkologische Sarkome

Ihr Team des Brust- und gynäkologischen Zentrums